

L'occhio è la nostra finestra sul mondo

L'universo parla attraverso frequenze,
noi interagiamo con il mondo che ci
circonda attraverso frequenze,

il lontano infrarosso
parla il linguaggio dei nostri muscoli...
rilassandoli



I nostri occhi sono come due cavalli legati ad un carro: perché il carro proceda per il suo percorso senza problemi è importante non tanto la velocità del singolo cavallo/OCCHIO (**capacità di visione del singolo occhio, capacità discriminativa, il 'vedere'**), quanto il fatto che i due cavalli/OCCHI procedano coordinati (**binocularità, stereopsi, capacità localizzativa, valutazione delle distanze**).

IL RILASSAMENTO DELLA MUSCOLATURA CHE COORDINA GLI OCCHI INDOTTO DAL RIPIV® NE PERMETTE UN MOVIMENTO COORDINATO CHE FAVORISCE ANCHE I PROCESSI DI APPRENDIMENTO E LA CONCENTRAZIONE DURANTE LA LETTURA.



depah & comello

RIEQUILIBRATORE PERMANENTE AD INFRAROSSI A INGRESSO VISIVO

Modalità d'uso | Fate scorrere **delicatamente RIPIV®** lungo l'asta dell'occhiale in modo che la superficie riflettente sia vicina all'angolo dell'occhio. La parte più spessa deve essere posizionata in avanti. Non è necessario che il **RIPIV®** tocchi la pelle. In ogni caso testare il materiale ponendolo per qualche ora sull'avambraccio: in caso di comparsa di qualsiasi reazione evitare il contatto con la pelle.

Effetti collaterali | Non sono stati segnalati effetti collaterali: segnalare eventuali effetti alla RIPI S.r.l. L'uso del **RIPIV®** con il rilassamento della muscolatura extra oculare indotto può rendere non più funzionali le lenti in

uso: questo non può considerarsi effetto collaterale ma un beneficio che però rende necessaria la sostituzione con lenti spesso più leggere.

Controindicazioni | Cataratta. Lesioni cutanee di qualsiasi tipo in sede di applicazione.

Consigli per la scelta della montatura | L'asta deve essere all'altezza dell'angolo esterno dell'occhio in modo da posizionare correttamente **RIPIV®**. Evitare montature trasparenti (effetto prismatico non fisiologico). Se possibile scegliere montature con naselli in modo da mantenere sempre la centratura delle lenti assolutamente indispensabile per la funzionalità dell'occhiale da vista (fatevi consigliare dal vostro ottico).

Il trattamento dell'ipoconvergenza



RIPI Srl

Via XX Settembre 46
32035 Santa Giustina (BL)
www.ripisrl.it

D.M. classe I • N. registrazione 1110186 del 12/03/2014



RIEQUILIBRATORE
PERMANENTE
AD INFRAROSSI
A INGRESSO VISIVO




www.ripisrl.it

**massima
performance
visiva**

nel lavoro, nello sport e nella vita quotidiana

IL TEST DI CONVERGENZA PROSSIMALE

Si effettua guardando i nostri occhi mentre fissano per esempio **la punta di una matita che si avvicina lentamente sino alla radice del naso**: con estrema semplicità scopriamo eventuali tensioni dei muscoli che devono muovere i nostri occhi in modo coordinato. Se uno o entrambi gli occhi non riescono a mantenere la mira si parla di IPOCONVERGENZA.



ponendo il **RIPIV®** all'angolo dell'occhio ipoconvergente o all'angolo degli occhi ipoconvergenti, inizierà un'azione rilassante che in un tempo più o meno breve, permetterà all'occhio di muoversi liberamente e senza tensioni, prevenendo nel contempo eventuali recidive.




risultato in condizione di
IPOCONVERGENZA



RIPIV® è un dispositivo discreto ma efficace per trattare l'ipoconvergenza.

COME FUNZIONA **RIPIV®**

Posizionato sugli occhiali (**RIPIV®** non necessita un contatto diretto con la pelle) dà una sensazione di sollievo perché **riflettendo il lontano infrarosso** emesso dal nostro corpo, senza produrre calore, **rilassa i nostri occhi portando grandi benefici oltre alla funzione visiva binoculare, a tutto il nostro sistema posturale e quindi alla nostra salute.**



SINTOMATOLOGIA DELL'IPOCONVERGENZA

LETTURA • irritabilità e disturbi di concentrazione/apprendimento durante la lettura (e i nostri ragazzi... si distraggono e non leggono e se lo fanno rendono poco)

MOVIMENTO LATERALE • Mal d'auto • nausea al solo tentativo di leggere in auto

LUCI ARTIFICIALI • stanchezza mentale • cefalea frontale • irritabilità • bruciore agli occhi (non si vede l'ora di 'chiudere gli occhi') • il disagio provato in luoghi affollati di sera (andiamo al supermercato 'quando non c'è nessuno')

GUIDA • fastidio alla guida dopo un temporale magari al tramonto, con i riflessi sull'asfalto, di notte con rischio di colpi di sonno.

LOCALIZZAZIONE • maldestrezza • difficoltà a mantenere la traiettoria all'interno delle corsie in pista o in vasca o la difficoltà di anticipare i paletti o nell'affrontare buche e cunette nello sci (nel bambino piccolo che in passeggiata 'taglia continuamente la strada' al genitore)

TV/PC • affaticabilità • bruciore agli occhi • disturbo di concentrazione sonnolenza davanti al PC e/o al televisore (la sera si sentono gli occhi pesanti e stanchi)

SERA • irritabilità serale, nervosismo, cefalea frontale

I SEGNI DELL'IPOCONVERGENZA

- > Torsione del cingolo scapolare e dislivello delle spalle
- > Limitata rotazione del capo
- > Tendenza a tenere il capo inclinato da un lato

BENEFICI DI **RIPIV®**

L'assenza di effetti collaterali di RIPIV®

unitamente alla estrema facilità d'uso ne consigliamo un impiego su vasta scala al **PC** e **TV**, durante la **lettura**, nella **quotidianità**, nel **lavoro**, nello **sport**, a **scuola**, in corso di **trattamento ortodontico**, in **oculistica**

